

پیرو اطلاعیه شماره ۱۹ مورخ ۹۵/۰۲/۰۸ با توجه به طغیان آفت پسیل در بعضی باغ ها و به منظور اثر بخشی بهتر سم مونتوو رعایت موارد ذیل الزامی است:

- ۱) میزان قابل توصیه سم مذکور نیم در هزار می باشد که در صورت لزوم می تواند به همراه ۲ در هزار صابون محلولپاشی شود و هرگونه افزایش مقدار سم مورد تأیید مراجع ذیبط تحقیقاتی و اجرائی نمی باشد.
- ۲) توصیه اختلاط حشره کش مونتوو با سموم ضربه ای دیگر مانند سموم گروه پیروتیروئید ( دسیس، آمبوش، فن والریت، کلروپیرفوس یا درسبان و ...) کاملاً غیر علمی بوده و میتواند عواقب ناخواسته ای در پی داشته باشد.
- ۳) دمای مناسب برای سمپاشی حداکثر ۲۵ درجه سانتی گراد می باشد و گرمای بیش از آن توأم با شدت تابش خورشید و بالا بودن میزان اشعه ماورای بنفش می تواند اثرات نامطلوبی در اثربخشی سمپاشی داشته باشد.
- ۴) تاثیر مطلوب سم مونتوو معمولاً یک هفته بعد از سمپاشی مشاهده می شود که این مهم بایستی مورد توجه کشاورزان قرار گیرد.
- ۵) سم پاشی با آبهای شور ( EC بالای ۸ دسی زمینس بر متر) باعث کاهش تاثیر دراز مدت حشره کش مونتوو می گردد و هم چنین برای سمپاشی با مونتوو باید از آبهای دارای Ph پایین استفاده کرد ( Ph ۵/۵ تا ۶/۵ بهترین اثر را دارا می باشند).
- ۶) هنگام تهیه محلول سمی بایستی اختلاط آن با آب داخل تانکر به خوبی انجام شود و عملیات سم پاشی حتماً در هوای خنک و آرام صورت پذیرد.
- ۷) اظهار نظر در خصوص اینکه قبل از سمپاشی با مونتوو به فاصله کوتاهی سمپاشی با سموم دیگر انجام گرفته و اصطلاحاً باغ کاملاً تمیز باشد مورد تأیید مراجع ذی صلاح علمی نمی باشد.
- ۸) لازم به تذکر است که سم مونتوو دارای کارایی نسبتاً پائینی بر روی حشرات بالغ پسیل بوده و بعضاً تغذیه حشرات بالغ میتواند ادامه پیدا کند، که این موضوع می بایستی توسط کارشناسان ذیربط و کشاورزان در مدیریت مبارزه با آفت مورد توجه قرار گیرد.
- ۹) موفقیت در روش توصیه شده در این اطلاعیه نیازمند تهیه سموم با کیفیت از فروشگاه های مجاز در قبال اخذ فاکتور توسط کشاورز می باشد.
- ۱۰) در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۳۴۲۸۸۲۰۰ در ساعات اداری تماس حاصل فرمائید.

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان