

## دستور العمل استفاده از سم مونتو علیه پسیل پسته

تهیه کنندگان: سید یحیی امامی، علی تاج آبادی پورو فاطمه کاظمی - محققین پژوهشکده پسته

مرضیه رضایی تاج آبادی - دبیر ستاد شبکه مراقبت و پیش اگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان

- با توجه به اینکه خسارت آفت پسیل در طول ماههای تیر، مرداد و شهریور بیشتر از سایر زمان‌هاست لذا چنانچه سماپاشی مونتو در این ماه‌ها انجام گیرد نتیجه بهتری حاصل خواهد شد.
- در صورتیکه سماپاشی در باع‌های تازه آبیاری شده انجام گیرد تاثیر بهتری خواهد داشت.
- در صورت سماپاشی در مرحله تخم و پوره‌های سنین اول تا سوم پسیل، نتیجه تاثیر آفت کش مونتو بهتر خواهد بود.
- با توجه به اینکه حشره کش مونتو از طریق برگ جذب می‌شود لذا در صورتیکه برگ‌های درخت تمیزتر باشند تاثیر بهتری از مونتو دیده می‌شود هرچند در صورت داشتن مقدار کمی آلودگی به پسیل و عسلک باز هم مونتو تاثیرگذار خواهد بود.
- سماپاشی در هوای خنک و بدون باد صورت گیرد و تمام برگ‌های درخت را پوشش دهد.
- غلظت مصرفی مونتو جهت کنترل پسیل پسته ۰/۵ در هزار لیتر آب می‌باشد.
- در صورتیکه آلودگی آفت بمخصوص در ارقام حساس مانند احمد‌آقایی، اکبری و کله قوچی که برگ‌بزی بیشتری دارد بالا باشد توصیه ارجح این است که ابتدا با یک حشره کش معمولی سماپاشی انجام گیرد و پس از کاهش جمعیت آفت، از سم مونتو استفاده گردد.
- در صورتیکه درختان باع آلودگی کم یا متوسطی به آفت دارند می‌توان به همراه مونتو ۱/۵ تا ۲ لیتر صابون سماپاشی استفاده نمود.
- تاثیر مونتو در pH های پایین و حدود ۵/۵ تا ۶/۵ بهتر است و هرچه pH افزایش یابد تاثیر سم کمتر می‌شود که در اینگونه موارد می‌توان از محلول‌های کاهش دهنده pH استفاده نمود ولی در صورت عدم سترسی به آب‌های با pH موردنظر توصیه می‌گردد بلافاصله پس از تهیه محلول سمي، سماپاشي انجام گيرد.
- سماپاشی با آب‌های شور که EC آنها بالاتر از ۸ باشد اثر دراز مدت سم را کمی کاهش می‌دهد.
- در زمان تهیه محلول سمي رقیق سازی قبل از افزودن به تانکر انجام گیرد.
- قوطی سم را قبل از مصرف باید به خوبی به هم زد و در صورت امکان از سماپاش دارای هژن استفاده نمود.
- نتیجه مناسب یعنی کاهش جمعیت آفت پسته به شرایط باع از ۵ تا ۷ روز پس از سماپاشی دیده می‌شود.
- بعد از سماپاشی در بعضی باع‌ها ممکن است جمعیت هایی از حشرات کامل آفت مشاهده شود که در این شرایط سماپاشی باع ضرورت ندارد و در این رابطه باید جمعیت پوره‌های آفت روی برگ‌ها بررسی و مدنظر قرار گیرد.
- به هر دلیل چنانچه بعد از مصرف مونتو نیاز به سم پاشی برعلیه پسیل بود از سوموم دیگر استفاده و از تکرار مونتو خودداری شود (برای جلوگیری از بروز زودهنگام مقاومت).
- تهیه مونتو از فروشگاه‌های مجاز صورت گیرد و پس از مصرف قوطی آن معدوم گردد.