

اطلاعیه شماره 25

تاریخ 92/3/4

باغداران محترم شهرستان رفسنجان

به استناد بررسی های انجام شده توسط کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی آفت سوسک طوقه و ریشه پسته (کاپنودیس) در بعضی باغات پسته شهرستان خصوصا باغاتی که دچار ضعف و کم آبی می باشند، مشاهده گردیده است. حشرات بالغ این آفت از اواخر اردیبهشت ظاهر و ظهور حشرات ماده به صورت تدریجی و حتی در اواخر تابستان نیز دیده می شوند. تخم گذاری معمولا در اطراف طوقه و در شکاف های پوست تنه درختان مسن و یا در شکاف خاک و به ندرت روی برگها و شاخه ها صورت می گیرد. حشرات کامل کمی از برگ درختان میزبان تغذیه نموده و تغذیه لاروها از قسمت های چوبی طوقه و ریشه درختان پسته صورت می گیرد. این حشره یکی از عوامل خشک شدن درختان پسته محسوب می گردد. این آفت دارای یک نسل در طی 2 تا 3 سال می باشد. جهت مبارزه شیمیایی در زمان مشاهده جمعیت زیاد حشرات کامل می توانید 10 لیتر از محلول 4 در هزار فنیتروتیون را در 10 سانتی متری اطراف طوقه ریخته و سپس 10 لیتر آب روی همان قسمت بریزید.

توجه: تغذیه اصولی و تقویت درختان توام با آبیاری مناسب و خارج ساختن به موقع لاروها از داخل کانال با مفتول سیمی باعث کاهش جمعیت آفت می گردد. در مبارزه شیمیایی به اصول مبارزه دقت نمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مستقر در مرکز خدمات و یا تلفن 8228200 تماس حاصل فرمایید.

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان