

اطلاعیه شماره ۴۰

تاریخ ۹۳/۳/۳۱

باغداران محترم شهرستان رفسنجان

نظر به سئوالات مکرر باغداران محترم پسته کار از اعضا ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص چگونگی استفاده از آفت کش مونتو به منظور مبارزه با آفت پسیل پسته، حسب بررسی های فنی به عمل آمده موارد ذیل عنوان می گردد:

الف: دز موثر و به ثبت رسیده این آفت کش ۰/۵ در هزار و بدون هر گونه افزودنی می باشد.

ب: با صلاح دید کارشناسان فنی ذیربط و در صورت لزوم اختلاط آن با صابون سمپاشی (۲ در هزار) امکان پذیر می باشد.

ج: اثر آفت کشی این سم پس از سمپاشی شروع و به صورت تدریجی (بطئی) افزایش می یابد و معمولاً پس از ۷ روز به حد مطلوب و قابل مشاهده (توسط کشاورز) می رسد. بنابراین استفاده از این سم هنگام بالا رفتن جمعیت بالغ ها و در صورت مشاهده تخم ریزی زیاد آفت (قبل از خروج پوره ها از تخم) در اولویت می باشد.

د: اختلاط این سم با سموم ضربه ای همانند کلروپریفوس توصیه نمی گردد.

ر: سمپاشی مونتو در هوای خنک بسیار مهم بوده و از عوامل افزایش موفقیت مبارزه می باشد.

و: بر اساس تجربیات به عمل آمده در سال قبل در باغاتی که چند روز بعد از آبیاری این حشره کش استفاده شده بود، تاثیر محسوس تر و بهتری از این آفت کش دیده شده است.

ی: توصیه می گردد حتی المقدور از آبهایی با PH پایین برای اثر بخشی بیشتر استفاده شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۸۲۲۸۲۰۰ در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان