

## باغداران محترم شهرستان رفسنجان

حسب گزارشات کارشناسان ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی در خصوص مشاهده جمعیت آفت پسیل پسته (شیره خشک) امکان بروز خسارت ناشی از فعالیت آفت مذکور وجود دارد لذا جهت کنترل آفت توجه به مرحله زیستی آفت و اطمینان از جمعیت در حد آستانه خسارت ضرورت دارد.

سموم موثر برعلیه آفت پسیل پسته که مورد تأیید ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی بوده و بر روی آفت مذکور دارای اثر نسبتاً مطلوب می باشد ضمناً متذکر می گردد اولویت نام سموم اعلام شده ارتباطی با میزان تاثیر سموم برعلیه آفت نداشته و ترتیب ذکر آنها بر اساس حروف الفبا می باشد:

- انویدور(اسپیرودیکلوفن): ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- سیوانتو (فلوپیرادیفوران): ۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب
- زولون(فوزلون): ۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب
- کنسالت(هگزافلومورون): ۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب
- کنفیدور(ایمیداکلوپرید): ۴۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- موسپیلان(استامی پرید): ۵۰۰ گرم در هزار لیتر آب
- موونتو(اسپیروترامات): ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- بیسکایا(تیاکلو پرید): ۷۵۰ سی سی در هزار لیتر آب
- و هم چنین مایع ظرفشویی(ریکا) ۳/۵ لیتر در هزار لیتر آب و یا صابون محلولپاشی با همین دز با تأیید کارشناسان صلاحیت دار.
- ضمناً سموم زیر نیز اخیراً به لیست سموم مجاز افزوده شده اند:
- روی آگرو (ماترین): ۱ تا ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب
- آکتامیا ( تیامتوکسام): ۴۰۰ تا ۵۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- آف کیلر (پیرترین): ۲ لیتر در هزار لیتر آب
- مموری (تیامتوکسام): ۴۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- اکتیوا( تیامتوکسام): ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- آکتارا( تیامتوکسام): ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب
- رنوا(تیامتوکسام): ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب

- با توجه به اینکه سموم انویدور، کنسالت، زولون، موونتو و هم چنین ریکا و صابون های محلولپاشی بر روی دشمنان طبیعی از جمله زنبور پسیلوفاغوس و کفشدوزک ها کم خطر می باشند، توصیه میشود در صورت امکان در ابتدای فصل از این سموم استفاده شود.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ۳۴۲۸۸۲۰۰ در ساعات اداری تماس حاصل فرمایید.

ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان