

با استناد به گزارشات واصله از کارشناسان مناطق مختلف ستاد شبکه مراقبت و پیش آگاهی شهرستان در خصوص مشاهده آفت سنک بر روی گل های تازه باز شده درختان پسته و با توجه به وضعیت جوی موجود و بالا بودن رطوبت نسبی، خسارت قابل توجه آفت در صورت عدم مبارزه بموقع پیش بینی می گردد، لذا جهت کنترل آفت در صورت مشاهده میتوان از سموم ذیل استفاده نمود:

فنیتروتیون ۲-۱/۵ لیتر به همراه ۵ تا ۳ لیتر روغن ولک در هزار لیتر آب

الف) در صورتی که جمعیت آفت مذکور در باغ خیلی زیاد باشد می توان از سم افوریا ۳۰۰ سی سی در هزار لیتر آب استفاده نمود، گرچه موفقیت سم افوریا در جمعیت های بالای سنک مشخص گردیده ولی استفاده از آن کلیه آفات اول فصل را کنترل نمی کند و احتمال تلفات دشمنان طبیعی وجود دارد.

ب) سمپاشی در مناطقی انجام گردد که از مرحله گلدهی گذشته و دانه ها تشکیل شده باشند.

ج) از آن جهت که در صورت حذف علفهای هرز امکان ریزش سنک به خوشه های پسته وجود دارد، لازم است از این امر خودداری نموده و در خصوص زمان حذف علف های هرز حتما با کارشناسان ذیربط در ساعات اداری با شماره تلفن ۳۴۲۸۸۲۰۰ تماس حاصل فرمائید. لازم به ذکر است در زمان مبارزه علیه آفت مذکور علف های هرز هم سمپاشی شوند.

د) از آن جهت که خسارت آفت در مراحل ابتدایی تشکیل میوه می باشد سم پاشی در مرحله گل حتی در صورت مشاهده آفت توصیه نمی شود، ضمناً خسارت آفت تا زمان محکم شدن پوست استخوانی ادامه دارد.