



وزارت جهاد کشاورزی  
سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  
موسسه تحقیقات علوم باگبانی  
پژوهشکده پسته



## دستور العمل فنی

# استفاده از روغن ولک در باغات پسته به منظور جبران کمبود نیاز سرمایی



نگارندگان:

علی تاج آبادی پور و مریم افروشه

## شناسنامه اثر

وزارت جهاد کشاورزی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

موسسه تحقیقات علوم باگبانی

عنوان: دستورالعمل استفاده از روغن ولک در باغات پسته به منظور تامین نیاز سرمایی

نگارنده/نگارنده‌گان: علی تاج آبادی پور و مریم افروشه

داوران: محمد عبدالله عزت آبادی، حمید علیپور، حجت هاشمی نسب

ناشر: مؤسسه تحقیقات علوم باگبانی

این اثر در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۲۲ به شماره فروست ۶۵۳۷۸ در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.

## فهرست مطالب

عنوان.....	شماره صفحه
هدف .....	۱
مخاطبین .....	۱
دامنه کاربرد .....	۱
تعاریف .....	۱
بیانیه .....	۱
مقدمه .....	۲
اثرات روغن ولک .....	۲
موارد استفاده از روغن ولک .....	۳
نیاز سرمایی ارقام پسته .....	۳
مراحل گام به گام دستورالعمل .....	۴
ب: مراحل گام به گام روغنپاشی ولک .....	۴
ج: بایدها و نبایدها در تنظیم گامها .....	۶
خسارت های احتمالی روغنپاشی .....	۶
توصیه های تکمیلی .....	۷
مستندات مرجع .....	۷

## هدف

هدف دستورالعمل کاربرد روغن ولک به منظور رفع نیاز سرمایی درختان پسته، حفظ سلامت درختان و افزایش عملکرد محصول است.

## مخاطبین

مخاطبین اصلی این دستورالعمل کارشناسان کشاورزی، باغداران و به خصوص باغداران پیشرو در حوزه پسته‌کاری هستند.

## دامنه کاربرد

کاربرد روغن ولک، مستلزم در نظر گرفتن اصول ویژه‌ای است که رعایت آن‌ها می‌تواند در اثربخشی آن در رفع نیاز سرمایی و افزایش عملکرد حائز اهمیت باشد. در این راستا، رعایت نکات فنی مربوط به غلظت مناسب، روش و زمان کاربرد از خسارت به محصول جلوگیری می‌نماید.

## تعاریف

واژه‌های مرتبط با این دستورالعمل، "ولک"، "نیاز سرمایی" و "پسته" می‌باشد.

## بیانیه

»»» مسئولیت صحت مطالب و منابع مندرج در این اثر به عهده نویسنده یا نویسنده‌گان است. «««

**مقدمه**

ولک یکی از انواع روغن‌های معدنی و جزء اولین گروههایی است که در سال ۱۹۴۵ برای شکستن رکود جوانه گل مورد استفاده قرار گرفتند. روغن ولک درواقع به صورت یک حشره‌کش بر علیه آفات سپردار نیز استفاده می‌شود. ولی پس از پی‌بردن به توانایی این ماده در شکست رکود، از آن برای افزایش محصول و برداشت زودتر نیز استفاده شده است. ولک در واقع یک روغن تصفیه شده است که از ملکول‌های کربن‌دار تشکیل شده است. ترکیبات تشکیل دهنده روغن ولک به طور استاندارد شامل ۸۰ درصد پارافین، ۱۸ درصد آب و ۲ درصد امولسیفایر می‌باشد. مهمترین تأثیر روغن ولک، شکستن رکود جوانه‌ها می‌باشد. پژوهش‌ها نشان داده که پس از استفاده از روغن ولک، این روغن با ایجاد یک لایه غیرقابل نفوذ اکسیژن روی جوانه، مانع از ورود اکسیژن به جوانه می‌شود. میزان نفوذ اکسیژن به درون بافت‌ها بسته به ضخامت لایه روغنی و زمان از بین رفتن آن دارد که در مزرعه پس از ۱۰ تا ۱۴ روز می‌باشد. کمبود اکسیژن سبب شکسته شدن رکود می‌شود که اثر این شرایط بسته به میزان کاهش اکسیژن و مدت پایداری ولک متغیر است. در این حالت گیاه برای تنفس بهتر، سوخت و ساز را بالا برده تا بتواند روغن را تجزیه کند و این افزایش فعالیت باعث آغاز زود هنگام رشد جوانه‌ها می‌گردد. هرچه غلظت روغن بالاتر و ملکول‌های آن سنگین‌تر باشد، سوخت و ساز بیشتر و زمان دوام بیشتر می‌شود که این امر سبب موفقیت بیشتر در شکست رکود می‌گردد. همچنین استفاده از روغن علاوه بر ایجاد تنفس، باعث افزایش مقدار سایتوكینین، کلسیم و منیزیم در شیره خام گیاه می‌شود. دقت در کیفیت روغن ولک مورد استفاده از اهمیت زیادی برخوردار است. متأسفانه برخی از شرکت‌ها به جای استفاده از پارافین در تولید این محصول، از روغن سوخته یا گازوئیل استفاده می‌کنند. استفاده از این محصولات نه تنها اثری روی جبران نیاز سرمایی درختان ندارد بلکه خسارات زیادی را به رشد و نمو گیاه وارد می‌کند و باعث زوال تدریجی درختان می‌شوند. آزمایشگاه‌های کنترل کیفی روغن ولک می‌توانند در تشخیص روغن‌های ولک با کیفیت از روغن‌های بی کیفیت کمک نمایند.

**اثرات روغن ولک**

شدت اثر روغن ولک به دو عامل غلظت و زمان پاشیدن آن بستگی دارد. هرچه غلظت بالاتر و زمان کاربرد مناسب‌تر انتخاب شود، اثر مواد بیشتر می‌باشد. کاربرد روغن ولک در زمان مناسب برای ارقام با نیاز سرمایی بالا از جمله اکبری علاوه بر برطرف کردن نیاز سرمایی موجب یکنواختی رشد میوه‌ها، کاهش درصد پوکی، افزایش وزن صد دانه و افزایش عملکرد محصول در هر درخت می‌شود. باید به این نکته توجه نمود که با افزایش غلظت مواد ممکن است خاصیت سمی بودن نیز افزایش یابد. معمولاً مهمترین اندام حساس درخت، جوانه گل می‌باشد که مسموم شدن آن باعث کاهش محصول خواهد شد. روغن ولک در شرایط مختلف اثرات متفاوتی را نشان می‌دهد. دمای بعد از روغن‌پاشی، وضعیت تغذیه‌ای درخت، مرحله نمو جوانه و مقدار سرمایی دریافت شده بر اثربخشی روغن ولک تأثیر می‌گذاردند.

## موارد استفاده از روغن ولک

- جبران نیاز سرمایی ناکافی
- تسريع در گلدهی ارقام پسته دیرگل به دلایل: عدم وجود درختان نر دیرگل به حد کافی در منطقه و مواجه زمان گلدهی و تلقیح با گرما و مواجه رشد سرشاخه با گرما و مشکلات گلانگیزی و تشکیل جوانه گل
- همزمانی شکفتن جوانه‌ها
- افزایش طول دوره رشد و نمو
- زودرسی
- همزمانی رسیدن میوه‌ها
- افزایش شکوفایی جوانه‌های جانبی به خصوص در ارقامی که غالبیت جوانه انتهایی در آن‌ها شدید است.
- افزایش محصول، یکنواختی رشد میوه‌ها، کاهش اونس، کاهش درصد پوکی

## نیاز سرمایی ارقام پسته

نیاز سرمایی در ارقام مختلف پسته متفاوت است. با توجه به تحقیقات انجام شده نیاز سرمایی برخی از ارقام آمریکا و ایران در جدول زیر آمده است (شکل ۱). ارقام دارای نیاز سرمایی بالا مانند اکبری به خوبی به پاشش روغن ولک واکنش نشان می‌دهند.

شکل ۱. نیاز سرمایی برخی از ارقام پسته ایران و آمریکا

نیاز سرمایی بر حسب ساعت	رقم
	کرمان (رقم ماده غالب کالیفرنیا)
۱۰۰۰	پیترز (رقم نر غالب کالیفرنیا)
۹۰۰	کله قوچی
۶۵۰	اوحدی (فندقی)
۱۰۰۰	احمد آقایی
۷۵۰	اکبری
۱۲۰۰	فندقی غفوری
۱۲۰۰	چروک
۱۴۰۰	خنجری
۱۱۰۰	شاهپسند
۱۱۰۰	عباسعلی

۱۲۰۰	کال خندان
۸۰۰	کله بزی
۸۰۰	قرمز پسته

## مراحل گام به گام دستورالعمل

### **ب: مراحل گام به گام روغنپاشی ولک**

#### **گام اول: بررسی وضعیت قامین نیاز سرمایی منطقه**

- محاسبه نیاز سرمایی باید از زمانی شروع شود که درختان پسته بطور کامل برگریزی کرده باشند.
- محاسبه سرمای دریافت شده در منطقه پسته کاری معمولاً بعد از آخرين یخندهان های سخت زمستان (۱۵ تا ۲۰ بهمن ماه) انجام می شود.
- بهتر است از داده های دمایی نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به منطقه استفاده شود. بهترین حالت زمانی است که منطقه مججهز به ایستگاه هواشناسی باشد.
- میزان تخمینی سرمای دریافت شده از تاریخ محاسبه نیاز سرمایی تا تا بیدار شدن درخت محاسبه می شود. جهت تخمین میزان نیاز سرمایی مورد انتظار از آمار هواشناسی دراز مدت منطقه (حداقل ۵ ساله) استفاده می شود).
- میزان سرمای دریافت شده به اضافه برآورد میزان سرمای برآورد شده تا زمان تقریبی بیدار شدن درخت مبنای میزان سرمای تامین شده قرار گیرد.

#### **گام دوم: بررسی وضعیت درختان و هواشناسی در زمان روغنپاشی و بعد از آن**

در زمان استفاده از روغن ولک، درخت به هیچوجه نباید تحت شرایط زیر باشد:

- فقدان رطوبت خاک
  - درجه حرارت بالا
  - تغییر ناگهانی درجه حرارت
  - بادهای خشک و طولانی بعد از روغنپاشی
  - ضعف شدید درختان در اثر تولید محصول زیاد و برگریزی شدید در سال زراعی گذشته
  - ضعف شدید درخت به علت وجود بیماری و یا آفت شدید
- محلول پاشی در درجه حرارت بالا و یا در زمان وزش بادهای خشک، باعث می شود که تنفس گیاه افزایش یافته و خسارت در اثر کمبود رطوبت چند برابر شود.

محلول پاشی در درجه حرارت نزدیک بیش از حد روغن روی گیاه شده و می‌تواند مقاومت درخت را به سرما کاهش داده و سرخشکیدگی افزایش یابد، بنابراین بهتر است ۳ روز بعد از روغن‌پاشی یخندان وجود نداشته باشد.

بهتر است روغن‌پاشی زمانی انجام شود که ۷۰ درصد نیاز سرمایی رقم تامین شده باشد. اگر محلول‌پاشی در زمان رکود عمیق صورت پذیرد، در عمل تأثیر کمتری خواهد داشت.

روغن‌ها سازگاری خوبی با مناطق گرم دارند و در مناطق سرد تأثیر قابل توجهی ندارند. بارندگی بعد روغن‌پاشی باعث شستشوی روغن و کاهش تاثیر آن می‌شود، بنابراین بایستی حداقل ۴ تا ۵ روز بعد از روغن‌پاشی بارندگی وجود نداشته باشد.

زمان از بین رفتن اثرات روغن ولک در مزرعه پس از ۱۰ تا ۱۴ روز بعد از روغن‌پاشی می‌باشد.

### گام سوم: کاربرد غلظت مناسب روغن ولک

غلظت مناسب روغن ولک بستگی به وضعیت دماهای زمستان و تامین نیاز سرمایی دارد.

- هرچه زمستان ملایم‌تر باشد و نیاز سرمایی برآورده شده کمتر باشد، غلظت محلول‌پاشی روغن ولک افزایش خواهد یافت.

- به طور کلی، غلظت روغن ولک نبایستی از ۳ درصد (۳۰ در هزار) کمتر و از ۶ درصد (۶۰ در هزار) بیشتر باشد. ارقامی مانند کله قوچی و اوحدی حساسیت بالاتری نسبت به غلظت بالای روغن ولک دارند و نبایستی غلظت روغن از ۴ درصد بیشتر شود. بهتر است برای این ارقام از سایر ترکیبات جبران‌کننده نیاز سرمایی استفاده شود.

### زمان مناسب روغن‌پاشی

- زمانیکه بیش از ۷۰ درصد نیاز سرمایی رقم پسته مورد نظر تامین شده باشد و بعد از یخندان‌های شدید زمستان (۱۵ بهمن ماه به بعد) روغن‌پاشی انجام شود.
- ۴ تا ۶ هفته قبل از بیدار شدن درختان پسته رقم مورد نظر، روغن‌پاشی انجام شود.
- دامنه زمان مناسب روغن‌پاشی در استان کرمان از ۱۰ بهمن ماه تا ۱۰ اسفند ماه می‌باشد. البته زمان دقیق با توجه به آمار هواشناسی در هر سال و در هر منطقه توسط کارشناسان اعلام می‌شود.
- با توجه به خسارت‌های شدید روغن ولک در غلظت‌های بالا به درختان و احتمال اثرات معکوس روی بیدار شدن درخت، نبایستی روغن‌پاشی از ۲۰ روز قبل از بیدار شدن درختان به بعد انجام شود.
- درخصوص داشتن چند رقم نیازمند به روغن‌پاشی، ابتدا روغن‌پاشی روی ارقامی که نیاز سرمایی کمتری دارند و زودگل‌تر هستند، انجام شود.

#### گام چهارم: نحوه روغن‌پاشی

- از سم‌پاش‌های همزن‌دار استفاده شود.
- ابتدا بایستی روغن ولک با آب مخلوط گردیده و کاملاً همزده شود. محلول کاملاً همگن به تانک سم پاشی که تا نصف از آب پر شده است اضافه گردد و سپس به ظرفیت نهایی برسد. در زمان اضافه کردن محلول همگن روغن ولک و رساندن به ظرفیت نهایی بایستی همزن روشن باشد.
- روغن‌پاشی بعد از طلوع آفتاب شروع شده و نهایتاً تا ظهر پایان یابد. روغن‌پاشی در زمان نزدیک به غروب آفتاب مخصوصاً در شب‌هایی که احتمال يخ زدگی زیاد است سبب خسارت به جوانه‌ها و سرشاخه‌ها و ترشح صمغ از تنہ می‌شود.
- روغن‌پاشی بایستی در دو طرف درخت انجام شده و روی تمام سرشاخه‌های درخت و بطور یکنواخت پخش شود.
- در زمان روغن‌پاشی نبایستی بادهای شدید وجود داشته باشد چون باعث هدر رهوی زیاد محلول شده و همچنین پاشش یکنواخت روی کلیه شاخه‌ها انجام نمی‌گیرد.

#### ج: بایدها و نبایدها در تنظیم گام‌ها

#### خسارت‌های احتمالی روغن‌پاشی

- عملیات هرس تا دو هفته بعد از روغن‌پاشی نبایستی انجام شود. بهتر است عملیات هرس در باغاتی که نیازمند روغن‌پاشی هستند، قبل از روغن‌پاشی به پایان رسیده باشد.
- از اضافه نمودن هرگونه سم و ترکیبات غذایی به روغن ولک خودداری گردد. بخصوص ترکیبات مسی و فارج‌کش‌ها می‌توانند سرخشکیدگی شدیدی را ایجاد نمایند.
- در صورتیکه بعد از روغن‌پاشی تا دو هفته قبل زمان بیدار شدن درختان، بارندگی روی ندهد (مخصوصاً در مناطقی که گرد و خاک و ریزگرد زیاد است) بهتر است جهت شستشوی روغن از روی جوانه‌ها و شاخه‌ها از آب‌پاشی استفاده شود.
- استفاده مداوم روغن ولک (هرساله) و با غلظت بالا، اثرات منفی جانی زیادی روی درختان بر جای خواهد گذاشت. این اثرات به صورت سرخشکیدگی شاخه‌ها، تغییر رنگ تنه و افزایش اندازه عدسک‌ها یا در موارد بسیار شدید سبب خشک شدن قسمتی از درخت می‌شود.
- اثرات منفی روغن ولک در صورتی که تا سه روز بعد از پاشش، يخ‌زدگی اتفاق افتد، شدیدتر می‌گردد.
- مصرف زیاد روغن ولک در مناطق سرد ممکن است باعث شیوع قارچ بوتریتیس شود.
- بطور کلی اثرات منفی استفاده از روغن ولک مخصوصاً در غلظت‌های بالا به شرح زیر می‌باشد:
  - خشکیدگی سرشاخه‌ها
  - ایجاد شاخه‌های نابجا و تنہ جوش زیاد روی شاخه‌های اصلی


- خروج شیره آوندی از جوانه‌ها، سرشاخه‌ها و شاخه‌های چند ساله
- کاهش رشد درختان

### **توصیه‌های تکمیلی**

کاربرد روغن ولک مستلزم رعایت اصول ویژه‌ای است که رعایت آن‌ها می‌تواند در جبران کمبود نیاز سرمایی ارقام با نیاز سرمایی بالا از جمله اکبری و حفظ سلامت حائز اهمیت باشد.

### **مستندات مرجع**

این دستورالعمل فنی مستخرج از گزارش نهایی پژوهه/طرح تحقیقاتی با عنوان "بررسی اثر محلول پاشی دورمکس بر رفع نیاز سرمایی درختان پسته و اثرات آن روی گلدهی و صفات رویشی، زایشی و کمی و کیفی محصول" می‌باشد که با شماره فروست ۵۹۰۰۸ به تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ در مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی به ثبت رسیده است.



انتشارات موسسه تحقیقات علوم باگبانی

آدرس: کرج-بلوار شهید فهمیده - مجموعه موسسات تحقیقاتی کشاورزی کشور

کدپستی: ۳۱۳۵۹۳۳۱۵۱ صندوق پستی: ۳۱۷۵۵۱۴۷

تلفن: ۳۴۰۹۵۰۷۱ دورنگار: ۳۴۰۹۵۰۶۷

<https://www.hsri.ac.ir>